

## ***Prueba del Lazo. Método de Rumpel Leede.***

### ***Fundamento:***

*Consiste en apreciar el grado de resistencia de los capilares, al ejercer una presión en el brazo del paciente, tratando de provocar la aparición de una púrpura experimental.*

### ***Desarrollo de la técnica:***

*Revisar el antebrazo del paciente antes de comenzar la prueba.*

*Se coloca un esfigmomanómetro en el brazo del paciente, por encima del codo a una presión entre la mínima y la máxima alrededor de 80 mm de Hg, manteniéndose en adultos por espacio de 5 mints y en niños pr 3 mints.*

*Decir al paciente una vez retirado el esfigmo que levante el brazo por encima de la cabeza durante un mint; Seguidamente se observará la aparición o no de petequias.*

### ***Esta prueba tiene poco valor en:***

*Pacientes sangrantes.*

*Mujeres mayores de 40 años.*

*En gran número de alteraciones: metabólicas, inmunológicas y hematológicas.*

***Materiales:***

*Esfigmomanómetro.*

*Cronómetro.*

***Interpretación de los resultados:***

*Si en el antebrazo se observan petequias la prueba es positiva.*

*Si en el antebrazo no se observan petequias la prueba es negativa.*

***La prueba es positiva en:***

- 1. Trombocitopenia severa.*
- 2. Fragilidad capilar (congénita ó adquirida).*
- 3. Vasculitis alérgica de Shonlein Henoch.*
- 4. Tromboastenias. (positivo-negativo).*
- 5. Trombopatías. (positivo-negativo).*
- 6. Von Willebrand. (positivo-negativo).*

*La prueba mide:*

➤ *Lecho vascular.*

➤ *Plaquetas: a) Cualitativamente.*  
*b) Cuantitativamente.*

